

Point-clé sur les nouvelles recommandations vaccinales en 2017 :

- ▶ Le **BCG** est recommandé au cours du 2ème mois, sauf pour les nouveau-nés de Guyane et de Mayotte, pour lesquels la vaccination est recommandée avant la sortie de la maternité.
- ▶ L'âge de la primovaccination contre le **méningocoque C** est transitoirement abaissé à l'âge de 5 mois, avec une 2ème injection à l'âge de 12 mois. Le vaccin tétravalent contre les méningocoques de type A, C, Y et W peut dorénavant être prescrit dès l'âge de 6 semaines
- ▶ La vaccination contre les **papillomavirus humains** est proposée aux hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes (HSH) jusqu'à 26 ans. Chez les jeunes filles et les jeunes femmes non vaccinées antérieurement, le Haut Conseil de la Santé Publique (HCSP) recommande d'initier la vaccination par le vaccin nonavalent (qui protège contre 9 souches de papillomavirus contre 4 pour le vaccin précédemment recommandé) qui sera prochainement disponible.
- ▶ Le calendrier 2017 simplifie les recommandations vaccinales contre les **infections à pneumocoque** pour les personnes âgées de 5 ans et plus.
- ▶ Le calendrier vaccinal 2017 propose enfin des schémas de vaccinations alternatifs, compte tenu des difficultés d'approvisionnement rencontrées pour certains vaccins